



BOLLETTINO agro meteo - n° 6 - 28 MAGGIO 2018

SITUAZIONE CLIMATICA : LISON – tempo ancora variabile

	Minime	massime	precipitazioni
Marzo	3.6 (3.4)	11.2 (14.1)	116 (72)
Aprile	10.2 (4.4)	21.6 (18.1)	57 (91)
Maggio	13.8 (11.9)	24.7 (23.1)	75 (95)

La terza decade di maggio si sta concludendo sempre con tempo variabile, con precipitazioni sparse di lieve entità ma frequenti. Le temperature si sono riprese, continuando la tendenza ad essere superiori alle medie

stagionali. Le somme termiche hanno raggiunto 569 gradi/giorno (+ 239 sulla norma). Questa settimana continuerà ancora una certa variabilità con possibilità di precipitazioni sparse.



SITUAZIONE FENOLOGICA: confronto stazione pianura centrale trevigiana -anticipo notevole

Permane l'anticipo cumulato la scorsa settimana, con lo Chardonnay in allegagione, il Glera ed il Merlot in fioritura piena ed il Cabernet S. ad inizio fioritura. Assomiglia al 2007, anno più anticipato. Questo andamento è in linea con


la regressione e la tendenza dei 26 anni precedenti. I germogli continuano l'allungamento con valori superiori alle medie degli anni precedenti, soprattutto nel Glera.

ANDAMENTO DELLA FIORITURA 2018 (Istrana)

vitigno	date inizio fioritura			date piena fioritura			date allegagione		
	medie	2018	anticipo	medie	2018	anticipo	medie	2018	anticipo
bacò	6/5	4/5	2	11/5	6/5	5	14/5	8/5	6
chardonnay	23/5	11/5	12	27/5	13/5	13	31/5	19/5	13
glera	26/5	14/5	12	29/5	19/5	10	2/6		
merlot	27/5	19/5	9	30/5	21/5	9	4/6		
cabernet sauvignon	30/5	21/5	9	2/6			7/6		

Dati storici di riferimento: fonte materiale pubblicazioni cecat

Fenologia dello CHARDONNAY - dal 1992



Dati storici di riferimento: fonte materiale pubblicazioni cecat

SITUAZIONE FITOSANITARIA- segni in diffusione della peronospora

Come appare dalla tabella sotto, rispetto al 18 maggio, la situazione nei test non trattati ha subito una esplosione di sintomi sia nelle foglie che nei grappoli. Nei vigneti difesi i sintomi sono diffusi sulle foglie ma non frequenti. La raccomandazione dello scorso bollettino rimane valida. In funzione dell'andamento meteo si dovranno eseguire i trattamenti con l'obiettivo di



mantenere costante la **copertura** della vegetazione nuova e dei fiori in allegazione, **con interventi ravvicinati a dosi minime di rame**. Si trovano ancora macchie di botrite su foglia e anche qualcuna di black rot. Primi sintomi di flavescenza e ritrovamenti di **scaphoideus** di seconda e terza età.

Situazione della peronospora nelle aziende del **bio distretto** al 25 maggio

varietà	infezioni su test		infezioni su trattato	
	foglie	grappoli	foglie	grappoli
glera	20 macchie poco sp	0	molto poche ben pulito	0
verduzzo	50 macchie sp	0	macchie diffuse anche nella glera	0
glera	30% sporulanti	pochi grappoli colpiti	presenza di macchie anche sp	0
PN	30%	10%	macchie presenti con muffa	rari
tocai	40/50%	30%	qualche macchia sp	0
merlot	25 macchie sp	0	0 su pg e su glera viti giovani	0
PG	20%	qualche grappolo	bene su pinot male su glera ben invaso no grappoli	0

Scaphoideus

bacca appena allegata, con muffetta



Infiorescenza in allegazione
Invasa da muffetta di peronospora

macchia vecchia in espansione