


BOLLETTINO agro meteo - n° 7 - 1 giugno 2018

SITUAZIONE CLIMATICA : LISON – tempo ancora variabile


	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
minime 1994-2017	-1	-0,3	3,2	7,4	11,9	15,4	17,1	16,7	12,6	8,6	4,5	0
2018			3,6	10,2	14,4							
massime 1994-2017	7,6	9,6	14,1	18,1	23,1	27,2	29,8	29,6	24,8	19,3	13,2	8,4
2018			11,2	21,6	25,5							

Fonte arpav

Maggio si è concluso con tempo variabile, con **precipitazioni** sparse di lieve entità ma frequenti, (ma a volte intense in alcune località). Le **temperature** continuano ad essere superiori alle medie stagionali. Le **somme termiche** hanno raggiunto 663 gradi/giorno (+ 274 sulla norma). Questa settimana continuerà ancora una certa variabilità con possibilità di precipitazioni sparse. Nel mese di maggio la piovosità nella zona è stata inferiore al normale (con 70-80 mm); non ostante ciò la peronospora si è presentata abbastanza aggressiva.



Elaborazione da dati Arpav



SITUAZIONE FENOLOGICA: confronto stazione pianura centrale trevigiana -anticipo notevole

In tutti i principali vitigni è avvenuta l'allegagione con un notevole anticipo. In genere l'allegagione sembra buona. I grappoli dei pinot non si sono puliti; conservano i residui fiorali tra le bacche.

(Trattamento antibotritico e sfogliatura). I germogli continuano a crescere con ritmo minore rispetto alle settimane scorse.

ANDAMENTO DELLA FIORITURA 2018 (Istrana)

vitigno	date inizio fioritura			date piena fioritura			date allegagione		
	medie	2018	anticipo	medie	2018	anticipo	medie	2018	anticipo
bacò	6/5	4/5	2	11/5	6/5	5	14/5	8/5	6
chardonnay	23/5	11/5	12	27/5	13/5	13	31/5	19/5	13
glera	26/5	14/5	12	29/5	19/5	10	2/6	24/5	9
merlot	27/5	19/5	9	30/5	21/5	9	4/6	25/5	10
cabernet sauvignon	30/5	21/5	9	2/6	25/5	9	7/6	29/5	9

Dati storici di riferimento: fonte materiale pubblicazioni cecat

SITUAZIONE FITOSANITARIA- evoluzione grave della peronospora nei test non trattati

Al rilievo del primo maggio la situazione nei test non trattati ha mostrato una esplosione di sintomi sia nelle foglie che nei grappoli. Nei vigneti difesi i sintomi sono a volte diffusi sulle foglie ma non frequenti. Si ribadisce la necessità di eseguire i trattamenti con l'obiettivo di mantenere costante la **copertura** della

vegetazione nuova e delle bacche in allegagione, **con interventi ravvicinati a dosi minime di rame**. Sintomi di flavescenza e numerosi ritrovamenti di **scaphoideus titanus** di seconda e terza età. A breve daremo indicazioni per la lotta della cicalina.

*Situazione della peronospora nelle aziende del **bio distretto** al 1 GIUGNO 2018*

INFEZIONI DA PERONOSPORA NEI TEST NON TRATTATI - area LISON - 1 giugno


	FOGLIE		GRAPPOLI	
	INFEZIONE %	FREQUENZA %	INFEZIONE %	FREQUENZA %
GLERA	17	34	2	14
MERLOT	6	26	9	32
PINOT GRIGIO	27	56	31	72
PINOT NERO	27	54	30	58
TOCAI	66	90	73	94
VERDUZZO	10		7	
GLERA	40	70	31	66

INFEZIONE % = DANNO EFFETTIVO

FREQUENZA % = ORGANI COLPITI



Foglia invasa da macchie sporulate



Scapioideus su foglia