



BOLLETTINO agro meteo - n° 2 - 30 APRILE 2019

SITUAZIONE CLIMATICA : settimana incerta

Andamento climatico (Tra parentesi medie climatiche: 1981-2018)

Temp. Minime °C	Temp. Massime °C	Precipitazioni (mm)	Somme Term. (10°C)
-----------------	------------------	---------------------	--------------------

Aprile prima dec.	10,1 (7,2)	18,1 (17,5)	56 (32)	41 (24)
sec. dec.	9,9 (7,3)	19,4 (18,3)	26 (25)	47 (28)
ter. dec.	10,8 (9,5)	18,1 (20,4)	139 (26)	43 (49)



Precipitazioni in aprile

	4-5 APR	10-11 APR	23-25 APR	26-28 apr	totale
CASTELFRANCO	75	28	63	63	229
ISTRANA	55	26	58	61	200
MASER	69	33	51	71	224
VILLORBA	76	27	58	78	239
VOLPAGO	75	28	63	75	241
VALDOBBIADENE	89	52	90	58	289
FARRA DI SOLIGO	112	51	90	57	310
VAZZOLA	78	24	69	56	227
PONTE DI PIAVE	51	20	71	48	190
GAJARINE	85	28	80	77	270
LISON	50	23	67	39	179
PIANURA	74	31	69	62	236
COLLINA	86	41	74	65	266
OVEST	70	28	59	70	227
EST	66	24	72	55	217
NORD	101	52	90	58	300


Nella terza decade di aprile le temperature si sono abbassate soprattutto negli ultimi giorni, nei quali l'instabilità ha prodotto precipitazioni record.

Le somme termiche al 29 aprile sono a 181 gradi-giorno (+48 sulla norma).

Grandinate, spesso disastrose nell'area collinare del DOCG ma anche in pianura il giorno 26 ed anche il 28.

Le previsioni meteo fanno sperare ad una attenuazione delle piogge per i prossimi 3 giorni.

SITUAZIONE FENOLOGICA: accelerazione ma poi rallentamento



Il germogliamento nel Glera (grafico sopra) è iniziato con un leggero anticipo ma poi ha rallentato ed infine, dove è grandinato?

I vitigni a germogliamento tardivo sono germogliati nella norma. L'allungamento dei germogli è allineato con la norma per tutti i vitigni.

I primi dati confermano una fertilità delle gemme superiore alla norma, come da previsioni. Ma le grandinate, laddove si sono verificate, hanno ridimensionato i dati.

SITUAZIONE FITOSANITARIA - prime macchie ??


Dal giorno 24 e successivi, sono state individuate le prime macchie di peronospora in situazioni molto particolari, in collina: su viti giovani vicino a terra e molto avanti con il germogliamento. Quindi in situazioni non presenti, al momento dell'infezione, nella maggioranza degli ambienti.

Le abbondanti e continuative piogge dal 24 aprile e ancora in atto, sicuramente hanno innescato infezioni primarie la cui gravità si potrà valutare allo scadere dei rispettivi periodi di incubazione.


Le grandinate, solitamente quando ci sono già le infezioni secondarie, comportano forti attacchi di peronospora.

La difesa dovrà ispirarsi alla prevenzione delle infezioni secondarie, con interventi di copertura prima delle piogge previste o associati a prodotti endoterapici.

Probabili piogge infettanti



Fotocronaca della grandinata del giorno 27 aprile 2019 (da WhatsApp)



..... Prima



Subito dopo



Il giorno dopo